

Multiresistenter Ölrettich

# CONTRA

Spezialist für Gemüsefruchtfolgen



## Vorteile:

- Multiresistenter Ölrettich mit höchsten Ansprüchen an die Bodengesundheit - für alle Fruchtfolgen, besonders für Intensiv- und Gemüsekulturen
- Resistenznote 2+ in der Bekämpfung des Rübenzysten-Nematoden, Reduzierung von *Heterodera schachtii* und amtlich geprüfte Resistenz gegen *Meloidogyne chitwoodi*
- **CONTRA** ermöglicht eine effiziente Bekämpfung von *Meloidogyne hapla* (Nördliches Wurzelgallenälchen) in ökologischen Fruchtfolgen mit hohem Kleeanteil und Karottenanbau
- Keine Vermehrung von *Ditylenchus dipsaci* und schlechte Wirtspflanze für *Pratylenchus*-Nematoden auf sandigen Böden
- Kraftvolle, blattreiche Anfangsentwicklung mit geringer Neigung zum Blühen, für eine lange Standdauer

## Sorteneigenschaften: (nach offiziellen Prüfungen o. in Anlehnung an das Bundessortenamt)

schlecht / früh / kurz / gering      gut / spät / lang / hoch

Resistenz gegen Rübenzystennematoden	Resistenznote 2
Massebildung im Anfang	5
Neigung zum Blühen	3
Standfestigkeit	8

Züchter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH, Version: 06.11.2020 / 23.00

## Multiresistenter Ölrettich

# CONTRA

Spezialist für Gemüsefruchtfolgen

### Nutzung:

Multiresistenz  
Reduktion von Rübenzysten-Nematoden  
Verminderung von TRV  
Gründüngung  
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung  
Mulchsaat  
Humusaufbau  
Erosionsschutz  
Greeningfähig als Mischungskomponente  
Biofumigation

### Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen

Mais	++
Getreide	++
Raps	+
Zuckerrüben	++
Kartoffeln	++
Intensivkulturen	++
Leguminosen	++

### Agronomische Merkmale:

schlecht / früh / kurz / gering      gut / spät / lang / hoch

Unkrautunterdrückung	8
Erosionsschutz	8
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung	8
Humusaufbau	7
Kälte- und Frostresistenz	4
Trockentoleranz	7

Wurzeltyp	Pfahlwurzel
Maximale Durchwurzelungstiefe	180 cm

### Anbau:

Empfohlene Aussaatstärke	25 - 30 kg/ha
Saattiefe	2 - 3 cm
Aussaatperiode	Juli bis Anfang Sept. Im Gemüseanbau ab Anfang Mai - 6 bis 8 Wochen Standzeit sind für Bekämpfungserfolg notwendig.
Düngung	40 - 60 kg N/ha
Pflanzenschutz	Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig
Aussaatverfahren	Drillsaat nach sorgfältiger Bodenbearbeitung fördert die schnelle und gleichmäßige Entwicklung des Ölrettichs

Züchter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH, Version: 06.11.2020 / 23.00