

viterra® Zwischenfrucht-Mischung

SOMMERFUTTER

A2



... Futtermischung für die Ernte im Anbaujahr



Vorteile:

- Zusammensetzung wie empfohlene Qualitätsstandardmischung A2
- Liefert als Sommerzwischenfrucht zusätzliches hochwertiges Futter
- Kombination aus Einjährigem- und Welschem Weidelgras liefert gut strukturiertes Futter für Wiederkäuer
- Das massewüchsige Welsche Weidelgras ermöglicht eine Winterbegrünung nach der Ernte
- Hoher Vorfruchtwert durch gute Durchwurzelung und Garezustand des Bodens
- Mit Perserklee ist die Mischung als **viterra® SOMMERFUTTER** erhältlich

Mischungsdetails:

Mischungszusammensetzung	33 % Einjähriges Weidelgras
Gew.-%	67 % Welsches Weidelgras

ohne Kruziferen, ohne Leguminosen, winterhart

Version: 14.01.2020 / 7.00

viterra® Zwischenfrucht-Mischung

SOMMERFUTTER

A2



... Futtermischung für die Ernte im Anbaujahr

Nutzung:

Gründüngung
Eignung zur Biogas- / Futternutzung
Humusaufbau
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung
Erosionsschutz

Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen

Mais	++
Getreide	++
Raps	++
Zuckerrüben	+
Kartoffeln	
Intensivkulturen	
Leguminosen	+

Agronomische Merkmale:

schlecht / früh / kurz / gering gut / spät / lang / hoch

Unkrautunterdrückung	3
Erosionsschutz	6
Humusaufbau	5
Trockentoleranz	5

Anbau:

Empfohlene Aussaatstärke	40 - 45 kg/ha
Saattiefe	2 - 4 cm
Aussaatperiode	Ende Juni bis Ende Juli (zur Begrünung bis Ende August)
Düngung	Startgabe für bessere Anfangsentwicklung wird empfohlen. Relevanter Leguminosenanteil laut DüV: 0 %
Pflanzenschutz	Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig
Aussaatverfahren	Drillsaat
Ernte	Als Grünfütter und Silage mit Ladewagen oder Häcksler nach Anwelkphase
Erntetermin	Oktober

Version: 14.01.2020 / 7.00